

Disfunción sexual eréctil en pacientes diabéticos atendidos en la consulta de terapia sexual a nivel comunitario.

Alberto Martínez Cárdenas¹, Asdel Alberto Martínez González², Lisbetty Annareya Rodríguez Domínguez ³, Rita Irma González Sábado⁴.

¹ MSc. Lic. Psicología. Profesor Auxiliar e Investigador Agregado. Policlínico I. Dra. Francisca Rivero Arocha. Manzanillo. Granma. Cuba, <http://orcid.org/0000-0002-1639-6148>

² Especialista de primer grado en Medicina General Integral. Profesor Instructor. Aspirante a Investigador. Policlínico II. Dr. Ángel Ortiz Vázquez. Manzanillo. Granma. Cuba, <http://orcid.org/0000-0002-3013-2210>

³ Especialista de primer grado en Medicina General Integral. Profesor Instructor. Aspirante a Investigador. Policlínico II. Dr. Ángel Ortiz Vázquez. Manzanillo. Granma. Cuba, <http://orcid.org/0000-0002-1214-6838>

⁴ MSc. Lic. Psicología. Profesora e Investigador Auxiliar. Facultad de Ciencias Médicas Celia Sánchez Manduley. Manzanillo. Granma. Cuba. Email: riar@infomed.sld.cu, <http://orcid.org/0000-0002-6336-1271>

RESUMEN

Introducción: La impotencia asociada a la diabetes puede aparecer a cualquier edad y es preciso atenderla. **Objetivo:** describir la morbilidad de disfunción sexual eréctil en pacientes diabéticos. **Diseño metodológico:** La investigación es descriptiva, el universo de trabajo lo conformaron todos los pacientes diabéticos atendidos en la consulta multidisciplinaria de Orientación y Terapia Sexual Municipal 18 (100%) en el periodo de febrero 2017-febrero 2018, explorando las variables de: edad, tipo de diabetes mellitus, tiempo de evolución de la diabetes, causa de la disfunción (psicógena u orgánica), intensidad de la disfunción eréctil y niveles de ansiedad como estado y como rasgo , se aplicaron varios instrumentos para la recolección de los datos como entrevista clínica psicológica, cuestionario para la salud sexual masculina (IIFE) y el inventario de ansiedad rasgo-estado (IDARE). Los datos se procesaron apoyados en la estadística descriptiva: análisis porcentual y números absolutos. **Resultados:** Predominio de pacientes diabéticos tipo II con más de 50 años de edad y más de 10 años de padecer la enfermedad e incluidos en la etapa de la vida de adulto medio y mayor, la causa de la disfunción es mayormente de tipo orgánica, la intensidad de la disfunción sexual eréctil en los pacientes fue grave y moderada siendo en su mayoría con el diagnóstico de

diabetes tipo II y al evaluar el tipo de ansiedad predomina la ansiedad estado a niveles medio y alto. **Conclusiones:** Se encontró alta presencia de disfunción eréctil de mantenimiento en los pacientes diabéticos atendidos en la consulta especializada de orientación y terapia sexual.

Palabras claves: disfunción sexual eréctil, diabéticos, consulta de terapia y orientación sexual.

Summary

Introduction: The impotence associate to the diabetes can to appear to any age.

Objective: to describe the morbidity of sexual erectile dysfunction **Methodology:** The research is descriptive, the work universe was made up of all diabetic patients attended in the multidisciplinary consultation of Guidance and Municipal Sexual Therapy 18 (100%) in the period of February 2017-February 2018 exploring the variables of: age, type of diabetes mellitus, time of evolution of diabetes, cause of dysfunction (psychogenic or organic), intensity of erectile dysfunction and levels of anxiety as a state and as a trait ,several instruments were used for the collection of data such as clinical psychological interview, questionnaire for male sexual health (IIFE) and the inventory of anxiety (IDARE). The results were processed based on descriptive statistics: percentage analysis and absolute numbers.

Results: Finding a predominance of type II diabetic patients with more than 50 years, with more than 10 years of suffering from the disease, and included in the adult and middle adult life stage, the cause of the dysfunction is mostly of organic type, the intensity of sexual erectile dysfunction in patients was severe and moderate being mostly with the diagnosis of type II diabetes And when assessing the type of anxiety predominates state anxiety at medium and high levels.

Conclusions: There is high morbidity of sexual erectile dysfunction in patients attended in the Municipal Sexual Therapy.

Key words: erectile dysfunction, diabetics, counseling and sexual orientation.

INTRODUCCIÓN

En el hombre la principal patología sexual es la disfunción eréctil (DE) ¹ considerada como incapacidad persistente para conseguir o mantener la erección con suficiente rigidez para permitir una actividad sexual satisfactoria.

Uno de los grandes avances en la sexología contemporánea ha sido la observación directa de las modificaciones corporales fisiológicas, tanto genitales, como extra-genitales, que se presentan en el ser humano durante la respuesta sexual. Tales

modificaciones, observadas por Máster y Johnson, se ordenaron y agruparon en lo que se llamó Ciclo de Respuesta Sexual fisiológica (excitación, meseta, orgasmo y resolución).²

En la práctica clínica, cuando se presenta una alteración de dichas modificaciones fisiológicas, se habla de Fisiopatología de la respuesta sexual tal como refirió Bianco en 1978 o Disfunción Sexual como se maneja en el DSM-IV, la cual se manifiesta con síntomas diferentes según la fase del ciclo que esté alterada y en forma independiente de los síntomas característicos de las alteraciones del deseo sexual.³

En la década de 1960, Masters, Johnson y Kolodny, estructuraron por primera vez la respuesta sexual humana y sus disfunciones. Como reconocen Kolodny y cols los factores endocrinos y dentro de ellos la diabetes mellitus es causa frecuente de impotencia. Las estimaciones de la frecuencia de casos entre los varones diabéticos van del 40 al 60%, con un consenso general sobre el hecho de que aproximadamente 1 de cada 2 varones con diabetes clínicamente evidente padece una disfunción sexual.⁴

La Diabetes Mellitus (DM) es hoy día un problema creciente de salud tanto para el mundo desarrollado como subdesarrollado. En 1994 existían 100 millones de personas con Diabetes, se pronosticó que habría 165 millones en el año 2000, 239 millones en el 2010 y 300 millones en el 2025.⁵

La diabetes mellitus entendida como la que reconoce a pacientes con síntomas y signos clásicos de hiperglucemia y cifras de éstas confirmadas, es decir 7,8 mmol/L (120mg/Dl) o más en ayuna; o pacientes con 11,1mmol/L (200mg/Dl) 2 horas después de una prueba de sobrecarga de 75 gramos de glucosa.⁵

La impotencia asociada a la diabetes puede aparecer a cualquier edad, aunque la mayor parte de los estudios publicados indican una tendencia algo menor a la aparición de este problema en los diabéticos de entre 20 y 40 años (probablemente entre un 25 y un 30% de los varones de este grupo son impotente) que en el grupo de edad de 50 años o más, en el cual el porcentaje es de un 50 a un 70%. Tal diferencia es atribuible, en parte a cambios en la circulación como consecuencia de arterioesclerosis aceleradas que aparecen más visiblemente en el grupo de población diabética de mayor edad.⁴

En la actualidad, se prefiere no utilizar el término impotencia, para eliminar todo matiz peyorativo. Esta definición se restringe a la capacidad de la erección del pene y no incluye trastornos del deseo sexual, la eyaculación o el orgasmo.

La disfunción eréctil (DE) está causada por una amplia gama de factores orgánicos, psicológicos, psiquiátricos, interpersonales y farmacológicos. Los factores psicológicos pueden dar lugar a ansiedad en relación con el acto sexual, pérdida de autoestima y aumento de la ansiedad que, a su vez, empeora la depresión y/o el estrés, estableciendo así un círculo vicioso.⁶

Su prevalencia e incidencia se asocian al envejecimiento y a otras comorbilidades como la diabetes, síndromes metabólicos, obesidad, adicciones, trastornos cardiovasculares, hiperlipidemia, depresión, efectos secundarios de fármacos, desórdenes neurológicos, trastornos prostáticos y problemas psicológicos e interpersonales.⁷

Según el anuario estadístico del 2015 en su edición 2016⁸ señala las muertes por diabetes mellitus en Cuba con una tasa de 20,1 por 100000 habitantes, ubicada en la 8va causa de muerte general. En Granma se registra una tasa de 19,8 x 100000⁹ y en Manzanillo 23 x 10000 habitantes¹⁰. La morbilidad es alta también y precisamente lo que debemos lograr una vez que ya tenemos al paciente enfermo es evitar las complicaciones y el deterioro de su salud y una de las complicaciones justamente son las disfunciones sexuales.

Las personas con Diabetes tienen una esperanza de vida reducida y una mortalidad 2 veces mayor que la población general. Una mejoría en el cuidado de la diabetes aumentaría la esperanza de vida de estas personas, pero esto a su vez llevaría una mayor incidencia de complicaciones microvasculares (nefropatía y retinopatía) y macrovasculares (enfermedades coronarias, cerebrovasculares y vasculares periféricas) ya que la edad y la duración de la Diabetes son los principales factores de riesgo no controlables, por lo que será necesario aplicar los conocimientos existentes o desarrollar tecnologías capaces de prevenir la aparición de la enfermedad y de sus complicaciones.¹¹

Tal como denota en el párrafo anterior el programa nacional de Diabetes Mellitus, hay que intensificar estudios que identifiquen las complicaciones de esta enfermedad como la disfunción eréctil para ser debidamente tratadas, lo cual ayudaría a estabilizar clínica y emocionalmente a este tipo de paciente, elevando su calidad de vida.

Problema de Investigación:

Si existe disfunción sexual eréctil en los pacientes diabéticos atendidos en la consulta de Orientación y Terapia Sexual ¿Cuál es la causa predominante, la intensidad y el nivel de ansiedad presente en ellos?

Objetivo: Caracterizar la disfunción sexual eréctil en los pacientes diabéticos atendidos en la consulta de Orientación y Terapia Sexual, de febrero 2017-febrero 2018.

Diseño metodológico.

Clasificación de la investigación: Se realizó un estudio descriptivo con los pacientes atendidos en la consulta de terapia y orientación sexual del municipio Manzanillo.

Definición de la población de estudio: Todos los pacientes atendidos con disfunción eréctil en la consulta de terapia y orientación sexual del municipio Manzanillo, siendo un total de 38 y con el diagnóstico de diabetes mellitus y disfunción sexual eréctil 18 (47,3%) por lo que trabajamos con este universo o población de estudio, en el periodo de febrero 2017- febrero 2018.

Tomando en cuenta para formar parte del estudio que tuvieran:

- Relación heterosexual estable de por lo menos seis meses a un año.
- Con una historia de haber tenido por lo menos 50% de relaciones sexuales con problemas de erección en los últimos tres meses.
- Dispuesto a participar en la investigación.

Criterios de exclusión:

- Presentar durante la entrevista señales o signos observables de trastornos psicológicos.

Finalmente trabajamos con la totalidad de 18 pacientes.

Distribución y clasificación de las variables objeto de estudio:

Variable dependiente: Pacientes diabéticos diagnosticados con disfunción sexual eréctil (DE).

Variables independientes: Consideramos como variables independientes:

-**Edad** (Cuantitativa continua). Según los años de vida se divide en: 20-24 años, 25-29 años, 30-34 años, 35-39 años, 40-44 años, 45-49 años, 50-54 años, 55-59 años, 60 y más.

- **Clasificación de la Diabetes Mellitus** (Cualitativa nominal).

CLASIFICACION ETIOLOGICA: (Abreviada) según el Programa nacional de Diabetes Mellitus ¹¹

A. Diabetes Mellitus tipo 1 (destrucción de células Beta, que lleva a una ausencia absoluta de insulina).

a) Autoinmune (presencia de ciertos tipos de anticuerpos circulantes, especialmente al debut)

b) Idiopática

B. Diabetes Mellitus Tipo 2 (insulino resistencia con insuficiencia relativa de insulina o defecto secretorio con o sin resistencia a la insulina).

-**Años de evolución de la enfermedad** (Cuantitativa continua): Se divide en: < 1 año, 1-4 años, 5-10 años, 10-14 años, > 15 años.

-**Causa de la disfunción sexual** (Cualitativa nominal). Se clasifica en psicógena y orgánica teniendo en cuenta los siguientes indicadores.¹²

INDICADORES	ORGÁNICA	PSICÓGENA
Edad	> 50 años	< 40 años
Comienzo	Gradual	Agudo
Tiempo de evolución	> 1 año	< 1 año: mínimo de 3 meses
Aparición	Permanente	Situacional
Curso	Constante	Variable
Erección extracoital	Pobre	Rígida
Problemas psicosexuales	Secundarios	Larga historia
Problemas de pareja	Secundarios	Al inicio
Ansiedad y miedo	Secundarios	Primarios

-**Tipo de disfunción sexual** (Cuantitativa continua). Se clasifica según la puntuación del cuestionario para la salud sexual masculina (IIFE-5)¹² en:

Disfunción eréctil grave: de 5 a 10 puntos.

Disfunción eréctil media: de 11 a 15 puntos.

Disfunción eréctil ligera: de 16 a 20 puntos

Función eréctil normal: de 21 a 25 puntos.

-Nivel de ansiedad como estado y rasgo de la personalidad (Cuantitativa continua). Según el Inventario IDARE ¹³, se divide en:
Alto (> = 45), Medio (30-44), Bajo (< = 30).

Técnicas y procedimientos

Como forma de obtención de la información se tomaron los datos de los siguientes documentos:

-Historia clínica individual: de este documento que consta en la consulta de Orientación y Terapia Sexual se tomaron los datos de la edad, tipo de diabetes mellitus y años de evolución de la enfermedad.

-Entrevista clínico-psicológica: para explorar la presencia de síntomas de disfunciones sexuales, de acuerdo con los criterios clínicos del Manual de Diagnóstico y Estadísticas de las Enfermedades Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana. (DSM4. II). ¹²

- El cuestionario para la salud sexual masculina (IIFE-5), se basa en el Índice Internacional de la Función Eréctil (IIFE-5). Fue diseñado con el fin de suministrar un instrumento diagnóstico abreviado en 5 preguntas para evaluar la Disfunción eréctil, conservando un elevado grado de sensibilidad y especificidad. ¹²

El IIEF es un test simple y rápido de administrar, consta de preguntas que evalúan 5 campos relativos a la función sexual del varón: función eréctil, función orgásmica, deseo sexual, satisfacción del acto sexual y satisfacción global, con una puntuación máxima 30, proporciona una medida fiable para clasificar la intensidad de la (DE) como leve, moderada o severa. Este cuestionario se suele reservar para la estandarización diagnóstica en estudios epidemiológicos, para graduar la gravedad de la DE y para cuantificar el impacto de los distintos tratamientos para la DE. Con alternativas de respuesta que van de 0, 1, 2, 3, 4, 5.

-Inventario de ansiedad rasgo-estado: es un instrumento para investigar los fenómenos de ansiedad (permite medidas objetivas de la ansiedad), comprende escalas separadas que miden dos conceptos independientes de la ansiedad, como Estado (E) y Rasgo (R). Creado por C. D. Spielberger, R. L. Gorsuch, R. E. Lushene.

Procesamiento estadístico.

Se realizó el análisis de los resultados apoyados en la estadística descriptiva: cálculo porcentual y números absolutos.

RESULTADOS

Tabla No. 1. Distribuir los pacientes diabéticos según edad y tipo de diabetes mellitus que padecen.

Grupos de edades	Tipo de diabetes				Total	
	Tipo I		Tipo II			
	No.	%	No.	%	No.	%
20-29	-	-	-	-	-	-
30-39	3	50	-	-	3	16.66
40-49	2	33.33	-	-	2	11.11
50-59	1	16.66	4	33.33	5	27.77
> 60	-	-	8	66.66	8	44.44
Total	6	33.33	12	66.66	18	100

Según los resultados observables predominan los pacientes diabéticos tipo II (66,66 %), de los cuales 12 pacientes superan los 50 años de edad, fundamentalmente con diabetes tipo II, la mayoría de los pacientes aquejados por disfunción sexual están ubicados en la etapa de la vida de adulto medio y adulto mayor con más de 10 años de padecer la enfermedad.

Tabla No. 2. Clasificar el tipo de disfunción presente en los pacientes diabéticos.

Tipo de disfunción eréctil	No.	%
Orgánica	12	66.66
Psicógena	6	33.33
Total	18	100

Sobresalen los pacientes con disfunción sexual orgánica (66,66 %) y la minoría de causa psicógena (33,33 %)

Tabla No. 3. Clasificar la intensidad de la disfunción presente en los pacientes diabéticos.

Intensidad de la disfunción eréctil	No.	%
Disfunción eréctil grave o severa	8	44.44

Disfunción eréctil media o moderada	8	44.44
Disfunción eréctil ligera o leve	2	11.11
Total	18	100

Al cuantificar los resultados del cuestionario para la salud sexual masculina (IIFE-5) obtuvimos que predomina en igual porcentaje los pacientes con disfunción grave y moderada (44,44 %).

Tabla No. 4. Clasificar la intensidad de la disfunción en los pacientes diabéticos y el tipo de diabetes mellitus que padecen.

Intensidad de la disfunción sexual	Tipo de Diabetes Mellitus				Total	
	Tipo I		Tipo II			
	No.	%	No.	%	No.	%
Disfunción eréctil grave o severa	1	16.66	7	58.33	8	44.44
Disfunción eréctil media o moderada	4	66.66	4	33.33	8	44.44
Disfunción eréctil ligera o leve	1	16.66	1	8.33	2	11.11
Total	6	33,33	12	66,66	18	100

Como puede observarse los pacientes diabéticos en su mayoría tienen disfunción sexual de tipo grave y moderada con mayor presencia para los diabéticos tipo II.

Tabla No. 5. Evaluar los niveles de ansiedad como estado y como rasgo.

Niveles de ansiedad	Tipo de ansiedad				Total	
	Rasgo		Estado			
	No.	%	No.	%	No.	%
Alto	-	-	6	42.85	6	33.33
Medio	2	50	7	50	9	50
Bajo	2	50	1	7.14	3	16.66
Total	4	22.22	14	77.77	18	100

Según los resultados del cuestionario IDARE para la ansiedad rasgo en igualdad predomina el nivel medio y bajo (50 %), mientras que en los pacientes con ansiedad estado la mayoría están clasificados en niveles superiores teniendo 6 (42,85 %) a nivel alto y 7 (50 %) a nivel medio. En general la mayoría de los diabéticos con disfunción sexual tienen ansiedad estado 14 (77,77 %).

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En la muestra estudiada en la tesis con salida doctoral de Reviriego... de todos los pacientes diabéticos el 10.78% (2.97% de la muestra total) presentaba diabetes mellitus insulínoddependiente (DMID), frente al 82.35% (22.67% de la muestra total) que presentaba diabetes mellitus no insulínoddependiente (DMNID).

14

En los EEUU, el estudio sobre Envejecimiento de los Varones de Massachussets descubrió que, entre los varones de edades comprendidas entre los 40 y los 70 años, entre el 39% y el 67% sufría algún grado de problemas de erección, lo cual fue comentado en la investigación de Mac Robertson.¹⁵

Los datos estadísticos que muestran estos autores son semejantes a los resultados del estudio que hoy socializamos, toda vez que a mayor edad mayor posibilidad de aparecer disfunciones sexuales y si se padece de una enfermedad endocrina- metabólica como la diabetes, el riesgo aumenta por las complicaciones vasculares.

Evidentemente no cabe lugar a dudas de que la DSE, por su impacto social, es una causa importante de la disminución de la calidad de vida en los hombres con diabetes mellitus. Su frecuencia es significativamente más elevada en la población diabética, cuando se compara con la población general. La DSE se asocia al incremento de la edad, mal control metabólico, al mayor tiempo de evolución de la DM, al hábito de fumar, al consumo de bebidas alcohólicas, a la depresión, al uso de algunos fármacos y a las complicaciones microvasculares de la DM, entre otros factores.¹⁵

La experiencia clínica apunta a que la calidad de la erección en varones con formas graves de disfunción eréctil de origen diabético no es tan buena como en varones sin diabetes. La gravedad de la disfunción eréctil aumentaba con la edad.

15

Hasta hace algunos años, la DSE se consideraba en más del 80-90 % de causa psicógena. En la actualidad, por el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas, este porcentaje se ha reducido al 40-50, según la mayoría de los autores.¹⁶

Resultados semejantes obtenemos en el estudio que hoy mostramos al contar la mayoría de los pacientes con DSE de tipo orgánica, lo que indica que la enfermedad de base (diabetes) influye, la experiencia clínica y los resultados investigativos consultados concuerdan que la DSE de causa psicógena es más frecuente en personas que no tienen de base enfermedades crónicas.

Según los resultados de la entrevista clínica psicológica aplicada que recoge la experiencia sexual y los antecedentes del problema, en la mayoría de los pacientes el tiempo de evolución de la DSE es superior a 1 año, el comienzo fue gradual, con un curso constante, la aparición permanente mantenida en el tiempo con fracasos en la relación sexual reiterada en el más del 60% en el último año, al explorar la calidad de la erección en otras situaciones durante el sueño, matinal, con otras parejas en su mayoría son deficientes o nulas, el deseo sexual está disminuido o ausente, la eyaculación es retardada o ausente, elementos que complementan el diagnóstico de una DSE de causa orgánica.

Tal como refiere Castelo Elías ¹⁶, en 1993 el Panel del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos recomendó el desarrollo de instrumentos adecuados, para cuantificar de manera objetiva el grado de DSE, así como para evaluar los resultados del tratamiento. Se desarrolló así el Índice Internacional de la Función Eréctil (IIFE). El IIFE resulta, por tanto, apropiado para su uso por médicos, clínicos e investigadores como un valioso complemento, de la historia sexual pormenorizada y otras pruebas diagnósticas utilizadas para la evaluación de la DSE.

Es muy cierto que el instrumento que usamos para obtener la clasificación de la intensidad de la DSE (IIFE) ha sido muy tenido en cuenta por varios investigadores por la naturaleza de los ítems que lo conforman y por la claridad con que permite ser evaluado el tipo de intensidad o daño en la respuesta sexual. Otro estudio comentado apunta que de los 120 pacientes portadores de DM2 a los que se les aplicó la escala IIFE, la media de edad fue de $49,28 \pm 7,5$ años. En los años de evolución se encontró una media de $6,53 \pm 6,02$ años desde el momento del diagnóstico. La media del puntaje obtenido por los pacientes en la escala IIFE-5 fue de $21,55 \pm 6,48$ puntos. El 55% (66) pacientes presentaron algún grado de disfunción eréctil según la escala IIFE-5, 28,3% (33) presentaron disfunción leve, 19,2% (23) disfunción moderada y 7,5% (9) cursaron con disfunción eréctil grave.

17

Consideramos que resulta evidente que los años de evolución de la enfermedad complican la magnitud de la disfunción sexual mayormente si ha sido un paciente que no ha tenido un control metabólico adecuado por no tener un régimen de vida acorde a su enfermedad de base.

Otro aspecto no menos importante y que se describe que tiene participación en el control y manejo de la DSE son las características personalógicas y los problemas psicológicos de base entre ellos una mayor tendencia a reacciones ansiosas de tipo rasgo (propios de la persona) o de tipo situacional (que se ponen de

manifiesto al enfrentar determinadas situaciones demandantes y sobre-exigentes para la persona como la situación concreta de enfrentar una incapacidad para satisfacer la vida sexual en pareja).

Según los resultados de la entrevista clínico-psicológica aplicada a los pacientes, en su mayoría mostraron altas expectativas por curarse influenciados por cumplir con el rol de pareja pero son poco reales sus aspiraciones atendiendo al desenlace de su competencia sexual actual y también es importante añadir que en su mayoría tenían poco conocimiento sobre la función sexual y respuesta sexual humana, elementos que favorecen estados ansiosos situacionales.

Al consultar la bibliografía encontramos el estudio Machado Ramírez que refiere.....cuando se analizó si algunas variables psicológicas (depresión, ansiedad y locus de control interno) y metabólicas (control glucémico e hipoglucemias graves) podían predecir la calidad de vida de pacientes con DM1, encontramos que la sintomatología depresiva y ansiosa (rasgo) de los pacientes con DM1 puede explicar la calidad de vida de dichos pacientes. En suma, encontramos que la ansiedad (rasgo) y la depresión son dos importantes variables que explican la calidad de vida de los pacientes con DM1. ¹⁸

En un trabajo analítico caso-control publicado se comentó haber encontrado en el grupo con trastornos de la erección diferencias significativas en la ansiedad-rasgo con puntajes arriba del valor de referencia, lo que indica que los hombres con trastorno de erección presentan sintomatología moderada de ansiedad-rasgo ¹⁹. Lo cual no es concordante con los resultados obtenidos en el trabajo que realizamos porque en la casuística investigada predominan los pacientes con trastornos de disfunción con predominio de ansiedad estado.

CONCLUSIONES

Fue posible encontrar morbilidad de disfunción eréctil en los pacientes diabéticos atendidos en la consulta especializada de orientación y terapia sexual.

Referencias bibliográficas

1- Cabello F. Disfunción eréctil: Un abordaje integral. Psimática. Madrid. Editor: Manuel Esbert. Capítulo I. Concepto de disfunción eréctil. Pág. 27-31. [Internet]. 2004 [citado 2017 ener 02]. Disponible en: https://www.google.es/?gws_rd=ssl#q=Cabello+F.+Disfunci%C3%B3n+er%C3%A9ctil:+Un+abordaje+integral.+Psim%C3%A1tica.+2004+Madrid.+Editor:+Manuel+Esbert.+Cap%C3%ADtulo+I.+Concepto+de+disfunci%C3%B3n+er%C3%A9ctil.+P%C3%A1g.+27-31, [Consulta realizada: 3 de febrero 2017]

- 2- Máster WH, Johnson VE, Kolodny RC. La sexualidad humana. La Habana: Edición Revolucionaria; 1989. p. 93-8.
- 3- American Psychiatric Association. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. (DSM-IV-TR). Madrid: Masson. Psicología Iberoamericana Vol. 15 No. 1, pp. 60-67. [Internet]. 2009 [citado 2017 ener 02]. Disponible en <http://files.sld.cu/arteydiscapacidad/files/2009/07/manual-diagnostico-y-estadistico-de-los-trastornos-mentales.pdf>.
- 4- Kolodny RC, Máster WH, Johnson VE. Tratado de medicina sexual. La Habana: Edición Revolucionaria; 1989. p. 96-97; 383-403.
- 5- Díaz Díaz O, Faget Cerero O. Capítulo116. Afecciones del páncreas. En Álvarez Sintés. Temas de Medicina General Integral. Vol. V. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2014. p. 1532.
- 6- Disfunción eréctil masculina. [Internet]. 2014 [citado 2017 ener 02]. Disponible en: http://www.fmvuba.org.ar/grado/medicina/ciclo_clinico/udhclin/PDF/DISFUNCION%20SEXUAL.pdf.
- 7- Méndez Gómez N, Valdivia Rodríguez T. Martínez Pérez MT, Miranda Arencibia O, Gil González P, Beauballet Fernández P. et al. Estudio multidisciplinario del paciente con disfunción sexual. Rev Cubana Med Milt 1990;4(2):51-3.
- 8- Anuario estadístico de salud. Ministerio de Salud Pública. [Internet]. 2016 [citado 2017 ener 02]. Dirección de registros médicos y estadísticas de salud, la Habana. Disponible en: http://files.sld.cu/dne/files/2016/04/Anuario_2015_electronico-1.pdf,
- 9- ONE. Oficina Nacional de estadística e información. [Internet]. 2016 [citado 2017 ener 02]. Disponible en http://www.one.cu/publicaciones/provincias_masinf/granma.htm,
- 10- ONE. Oficina Nacional de estadística e información. [Internet]. 2008 [citado 2017 ener 02]. Disponible en <http://www.one.cu/aed2014/33Granma/Municipios/06%20Manzanillo.pdf>,
- 11- Programa Nacional de Diabetes Mellitus. La Habana.2000. Disponible en: [http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/diabetes/programa_nacional_de_diabetes.p df](http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/diabetes/programa_nacional_de_diabetes.pdf), [Consulta realizada: 4 de febrero 2017]
- 12- Fórum de la Salud del hombre con Disfunción eréctil. Elaborado por 12 entidades científicas. [Internet]. 2006 [citado 2017 ener 02]. Disponible en: www.asesa.org/attach/admin/pro.../Documento_de_Consenso_sobre_DE.pdf
- 13- González Llana FM. Instrumentos de evaluación psicológica. Editorial Ciencias Médicas. Habana de 2007, 180 p.

- 14- Reviriego Almohalla B. Calidad de vida en pacientes con disfunción eréctil tratada con sildenafil e hipertensión arterial en atención primaria, Tesis doctoral. Facultad de Ciencias de la salud de la Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, [Internet]. 2003 [citado 2017 ener 02]. Disponible en: <https://eciencia.urjc.es/bitstream/10115/443/1/TESIS+REVIRIEGO.pdf>
- 15- Castelo Elías-Calles Lizet, Licea Puig Manuel E. Disfunción sexual eréctil y diabetes mellitus: Aspectos etiopatogénicos. Rev Cubana Endocrinol [Internet]. 2003 Ago [citado 2017 Mar 08] ; 14(2): Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-29532003000200007&lng=es.
- 16- López M Cruz M, Heredia V M. Elvira, González H Ricardo, Rosales P Eusebio. Disfunción eréctil en portadores de diabetes mellitus tipo 2 en edad productiva. Rev. méd. Chile [Internet]. 2013 Dic [citado 2017 Mar 08] ; 141(12): 1555-1559. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872013001200009&lng=es. <http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872013001200009>
- 17- Machado Romero Alberto, Anarte Ortiz María Teresa, Ruiz de Adana Navas María Soledad. Predictores de Calidad de Vida en Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1. Clínica y Salud [Internet]. 2010 [citado 2017 Mar 09];21(1):35-47. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1130-52742010000100004&lng=es